

WHO ファクトシート

麻疹（はしか）

Measles

2018年11月29日

重要な事実

- ・安全で費用対効果の高いワクチンがあるにもかかわらず、2016年には世界で89,780人が麻疹により死亡し、その多くは5歳未満の子どもたちであった。
- ・麻疹ワクチン接種により、2000年から2016年の間に麻疹による死亡は、世界全体で84%減少した。
- ・2016年には、世界の子どもたちの85%が最初の誕生日を迎えるまでに、定期接種を通じて麻疹ワクチンの第1回接種を受けた。接種率は2000年の72%から向上した。
- ・2000年から2016年の間に、麻疹ワクチン接種によって2,040万人の死亡が予防できたと推計され、麻疹ワクチンは公衆衛生における最も費用対効果の高い施策のひとつであるといえる。

本件ファクトシートについて、厚生労働省検疫所ホームページの[こちら](#)では全文の日本語訳が公開されていますので、ご参照下さい（改定前）

© World Health Organization

この文章は、日本WHO協会がWHOのメディアセンターより発信されているファクトシートのキーファクト部分について、2014年3月にWHO本部より付与された翻訳権に基づき作成したものです。

ファクトシートには、訳出部分以外にも当該案件に関する基本的情報や詳細情報へのリンク先などが示されていますし、また最新事情に合わせて頻繁に見直しが行われますので、更新日時を確認を含めWHOホームページでの原文をご確認ください。

Measles ファクトシート原文は [こちら](#)